

RM ABDOMINAL E PÉLVICA
FOLLOW-UP DE CARCINOMA DO OVÁRIO

INFORMAÇÃO CLÍNICA: []

PROTOCOLO TÉCNICO: [Equipamento].

[Abdómen (desde as bases pulmonares às cristas ilíacas): T2 axial; estudo de difusão axial e mapas de ADC].

Pélvis: T1 axial do ovário; T2 axial do ovário; sagital e axial da pélvis; estudo de difusão axial e mapas de ADC axial da pélvis; estudo dinâmico em T1 com saturação de gordura após administração de [] ml de [nome do contraste].

QUALIDADE DA IMAGEM: [Má; Satisfatória; Boa]

EXAMES COMPARATIVOS: [Sim – data e local; Não]

RELATÓRIO:

Formações ganglionares cardiofrénicas com eixo curto > 5 mm.

Há [] derrame pleural.

OVÁRIOS: Há / Não há tumor residual, medindo cm x cm.

ÚTERO: Posição: [anteversão/retroversão/retroflexão], lateralizado à [direita/esquerda]; Tamanho [Normal/>/<], Medidas: [X] x [Y] x [Z]cm

ENDOMÉTRIO: [normal/com alterações]; Espessura máxima do endométrio []mm

ZONA JUNCIONAL: Adeniose [não/sim], [ligeira/moderada/severa]

MIOMÉTRIO EXTERIOR: Leiomiomas [não/sim]

COLO DO ÚTERO: [Sem alterações]

VAGINA: [Sem alterações]

BEXIGA: Invasão [não/sim]

RECTO: Invasão [não/sim]

PAREDE ABDOMINAL / PÉLVICA: Invasão [não/sim]

Há / Não há metástases na superfície / parênquima hepático, esplénico.

URETEROHIDRONEFROSE: [não/sim]

Há /Não há envolvimento do mesentério do intestino delgado,com / sem evidência de obstrução intestinal.

Há /Não há ascite.

Há / Não há [] metástases omentais / peritoniais / implantes serosos / locais supra-cólicos: ligamentos gastro-hepático, gastro-esplénico, espleno-cólico.

Gânglios com eixo curto superior a 1 cm / conglomerados ganglionares de pequenos nódulos suspeitos.

Há / Não há obstrução / trombose venosa.

Ossos: [Sem alterações]

CONCLUSÃO/IMPRESSÃO:

1. [do achado mais relevante para o menos relevante]
2.

INTERPRETAÇÃO:

- **CONSISTENTE COM >90%**
- **SUSPEITO/PROVÁVEL ≈75%**
- **POSSÍVEL ≈50%**
- **POUCO PROVÁVEL ≈25%**
- **IMPROVÁVEL <10%**